



**ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

27 апреля 2020г.
г. Орёл

№ 319

О выявлении, диагностике и лечении больных туберкулезом в целях повышения эффективности принимаемых мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Орловской области

С целью своевременного выявления, диагностики и лечения больных туберкулезом, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить алгоритм обследования и ведения пациентов при подозрении на туберкулез в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (далее – алгоритм) согласно приложению 1.

2.1. Главным врачам бюджетных учреждений здравоохранения Орловской области:


2.1 организовать обследование и ведение пациентов при подозрении на туберкулез в соответствии с алгоритмом.

2.3. осуществлять направление данных для проведения консультаций фтизиатра по защищенному каналу связи VipNet на адрес приемного покоя БУЗ Орловской области «Орловский противотуберкулезный диспансер».


3. Главному врачу БУЗ Орловской области «Орловский противотуберкулезный диспансер» (Казенному Б. Я.) организовать диагностику и лечение больных туберкулезом согласно утвержденного порядка маршрутизации пациентов в случае сочетанной патологии туберкулеза и COVID-19 согласно приложению 2.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя руководителя Департамента – начальника управления здравоохранения Департамента здравоохранения Орловской области В. О. Николаева.

Член Правительства Орловской области –
руководитель Департамента
здравоохранения Орловской области

 И. А. Залогин

Алгоритм выявления, диагностики и лечения больных туберкулезом в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19



М(-) – микроскопия мокроты отрицательная,
 М(+)- микроскопия мокроты положительная,
 ДСТ (-) - диаскинтест отрицательный,
 ДСТ(+)- диаскинтест положительный
 R (-) - нет изменений на рентгенограмме,
 R(+)- выявлены изменения на рентгенограмме

В условиях распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и нахождении пациента на самоизоляции особое значение имеет своевременная диагностика туберкулеза, которая должна быть проведена преимущественно на дому. Обследованию на туберкулёз подлежат все лица, у которых в течении трех и более недель наблюдается кашель с мокротой. Таким пациентам назначается следующее обязательное обследование: исследование мокроты на кислотоустойчивой микобактерии (КУМ) методом световой микроскопии (не менее двух образцов, при возможности – одна из проб должна быть собрана утром), обзорная рентгенограмма органов грудной клетки и/или мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ), диаскинтест (ДСТ). Одновременно проводится исследование биологического материала на COVID-19. Забор мокроты, постановка и чтение диаскинтеста осуществляется на дому.

В зависимости от полученных результатов исследований в учреждениях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь могут быть следующие варианты:

1. анализ мокроты на КУМ в двух порциях отрицательный, изменений на рентгенограмме нет, тест ДСТ отрицательный. В данном случае данных за туберкулез нет, лечение проводится в соответствии с клиническим состоянием больного в учреждениях общей лечебной сети. Если тест ДСТ положительный назначается консультация врача-фтизиатра.

2. анализ мокроты на КУМ в двух порциях отрицательный, выявлены изменения на рентгенограмме, тест ДСТ отрицательный. Проводится дополнительное обследование, в том числе посев мокроты на вторичную микрофлору. Назначается неспецифическая терапия в течении 10-14 дней с повторным клинико-рентгенологическим обследованием и анализом мокроты на КУМ. При положительной клинико-рентгенологической динамике и отрицательном повторном анализе мокроты на КУМ туберкулез исключен. При отсутствии положительной клинико-рентгенологической динамики и отрицательном повторном анализе мокроты на КУМ проводится консультация фтизиатра с использованием телекоммуникационных технологий. При положительном повторном анализе мокроты на КУМ или при положительном тесте ДСТ проводится очная консультация врача-фтизиатра.

3. При получении положительного анализа мокроты на КУМ хотя бы в одной из порций и при наличии изменений на рентгенограмме высока вероятность диагноза туберкулеза. Сразу назначается очная консультация врача-фтизиатра.

При установлении диагноза туберкулеза врач-фтизиатр совместно с врачом эпидемиологом решает вопрос о месте дальнейшего обследования и лечения пациента с учетом тяжести его состояния и возможностей по соблюдению инфекционной безопасности лиц, проживающих с больным.

Если принимается решение о направлении пациента в стационар БУЗ Орловской области «Орловский противотуберкулезный диспансер» лечение пациента осуществляется: при отрицательном статусе COVID-19 в профильном отделении; при положительном статусе COVID-19 в изоляторе при соблюдении всех требований инфекционной безопасности при одновременном наблюдении врача-фтизиатра и врача-инфекциониста.

**Порядок маршрутизации пациентов в случае сочетанной патологии
туберкулеза и COVID-19.**

