Приложение к приказу Департамента
здравоохранения Орловской области
от _____№_____
Приложение к приказу Департамента
здравоохранения Орловской области
от _08.12.2023_____№_911____

Маршрутизация пациентов с внебольничными пневмониями на территории Орловской области (при наличии отрицательных тестов на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19))*

	Среднетяжелые формы Тяжелая степень тяжести Sp02<93%**	Среднетяжелые формы Тяжелая степень тяжести Sp02<93%**
Болховский	БУЗ ОО «Болховская ЦРБ»	БУЗ ОО «Болховская ЦРБ» БУЗ ОО «Городская больница им. С. П. Боткина»
Мценский Залегощенский Корсаковский Новосильский	БУЗ ОО «Мценская ЦРБ»	Перевод в реанимационное отделение (палата интенсивной терапии) БУЗ ОО «Мценская ЦРБ» и организация консультации с врачами специалистами БУЗ ОО «Городская больница им. С.П. Боткина»
Кромской Троснянский Дмитровский	БУЗ ОО «Кромская ЦРБ»	БУЗ ОО «Городская больница им. С. П. Боткина»
Ливенский Новодеревеньковский Краснозоренский Должанский Колпнянский Покровский	БУЗ ОО «Ливенская ЦРБ»	Перевод в реанимационное отделение (палата интенсивной терапии) БУЗ ОО «Ливенская ЦРБ» и организация консультации с врачами специалистами БУЗ ОО «Городская больница им. С.П. Боткина»,
город Орел Орловский	БУЗ ОО «Больница скорой медицинской помощи им. Н.А. Семашко» (при отрицательном результате на грипп)	БУЗ ОО «Больница скорой медицинской помощи им. Н.А. Семашко» (при отрицательном результате на грипп)
Сосковский Малоархангельский Свердловский Глазуновский Урицкий Хотынецкий Знаменский Шаблыкинский Верховский	БУЗ ОО «Городская больница им. С. П. Боткина»	БУЗ ОО «Городская больница им. С. П. Боткина»
город Орел Орловский	БУЗ ОО «Городская больница им. С. П. Боткина» (при положительном результате на грипп)	БУЗ ОО «Городская больница им. С. П. Боткина»

*- все пациенты с внебольничной пневмонией, имеющие показания к стационарному лечению, при наличии положительных результатов на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19)) подлежат госпитализации в БУЗ ОО «Городская больница им. С.П. Боткина». **- При наличии дыхательной недостаточности 2-3 степени (ЧДД > 24 в мин., ЧСС > 90 в мин., SpO2 < 93%), необходимости осуществления длительной респираторной поддержки (ИВЛ) вопрос о месте лечения, необходимости и возможности транспортировки пациента в профильное отделение решается с учетом рекомендаций консультантов (пульмонолога, реаниматолога, других необходимых специалистов).